


الأمراض المنقولة جنسياً

مقدمة:

الأمراض المنقولة جنسياً تعني : انتقالها من شخص مصاب إلى آخر سليم أثناء الإتصال الجنسي بين هذين الشركين.
هناك أمراض منقولة جنسياً خطيرة وكثيرة الإنتشار أهمها :



مرض السيلان:

عند المرأة	عند الرجال	مدة الحضانة
		يومان إلى خمسة أيام
- أعراض خفية - خروج قيح غير مؤلم من المهبل	- حكة واحمرار على مستوى فتحة القضيب - حرقة حادة عند التبول - خروج قيح من الإحليل	أعراض المرض
- إصابة الرحم ثم القاتنين المبيضيتين - إمكانية العقم في حالة مضاعفة المرض - إصابة المولود أثناء الولادة بالتهاب الماتحمة	- قبح انتقال المرض إلى المسالك التناسلية و الغدد التناسلية الملحة - قد تؤدي إصابة الخصيتين إلى العقم	تطور المرض في غياب العلاج
	- بكتيرية تدعى مكورة السيلان - لا تعيش هذه الجرثومة إلا في المسالك التناسلية	جرثومة المرض
	عن طريق الإتصال الجنسي بالضرورة	كيفية العدوى
	- تجنب الإتصالات الجنسية غير المشروعة - استعمال العازل الطبي - الخضوع للمراقبة الطبية	الوقاية
	بواسطة المضادات الحيوية وفقاً لوصفة طبية	العلاج





مرض السيفيليس:

مدة الحضانة	ما بين 3 أسابيع و 5 أسابيع
المرحلة الأولى : شهر واحد	<ul style="list-style-type: none"> - ظهور قرحة على شكل فرج قطره حوالي 1cm : * على القضيب غالباً * أحياناً على شفاه الفرج و غالباً في عنق الرحم * انتفاخ بعض العقد المفاوية في مستوى العانة
المرحلة الثانية : 3 سنوات	<ul style="list-style-type: none"> - اختفاء القرحة - تطور المرض ببطء : * ظهور لطخات وردية في مختلف أنحاء الجسم، مما يدل على انتشار جرثومة السيفيليس في سائر أعضاء الجسم * ظهور لطخات حمراء ثم بيضاء في مستوى الأعضاء التناسلية و حول الشرج * سهولة العدوى، لأن اللطخات أصبحت تشكل خزانًا لجرثومة السيفيليس
المرحلة الثالثة : 5 سنوات إلى 15 سنة	<ul style="list-style-type: none"> - اختفاء أعراض المرض - استمرار تطور المرض في الكمون - بعد مرور 5 إلى 15 سنة على العدوى، ظهور إصابات في مستوى الجلد، والعظام، والجهاز الدوراني، والجهاز العصبي، الشيء الذي يؤدي إلى الشلل والأمراض العقلية وأحياناً إلى الموت.
جرثومة المرض	اللولبية الشاحبة و هي بكثيرية لا تعيش خارج الجسم
كيفية العدوى	عن طريق الاتصال الجنسي في أغلب الحالات
الوقاية	<ul style="list-style-type: none"> - تجنب الاتصالات الجنسية غير المشروعة - استعمال العازل الطبي - الخضوع للمراقبة الطبية
العلاج	<ul style="list-style-type: none"> - يكون العلاج بالمضادات الحيوية فعالاً في المرحلتين الأولتين - تنقص فعالية المضادات الحيوية في المرحلة الأخيرة - ينبغي استشارة الطبيب بمجرد ظهور الأعراض الأولى للمرض



الوثيقة 14: جرثومة مرض السيفيليس (الزهري)

تصل إلى 6 أشهر	مدة الحضانة
- تصلب العدوى الأولية عادة بزكام و تعب شديد - ظهور يرقان (يعتبر اليرقان من أعراض التهاب الكبد و يستوجب زيارة الطبيب فورا)	أعراض المرض
حمة من النمط B : HBV	جرثومة المرض
- التهاب الكبد - التهاب الكبد المزمن - تشمع الكبد - سرطان الكبد	تطور المرض
توجد حمة HBV في جل الإفرازات العضوية عند المصايب كالدم، و المنى، و الإفرازات المهبلية، و اللعاب، و الحليب. لذلك فإن طرق العدوى متعددة و يبقى الاتصال الجنسي في مقدمتها.	طرق العدوى
- تجنب الاتصالات الجنسية غير المشروعة - استعمال العازل الطبي - عدم استعمال الوسائل الحادة غير المعقمة كالمحقنات و شفرات الحلاقة... - الخصوص للمراقبة الطبية - التلقيح ضد الكبد B : يوجد تلقيح ناجع ضد هذا المرض	الوقاية
لا يوجد علاج فعال ضد هذا المرض، لذلك تبقى الوقاية و خاصة التلقيح خير و سيلة للفضاء على الكبد B	العلاج

	
الوثيقة 16: مضاعفات مرض الكبد B	الوثيقة 15: جرثومة مرض الكبد B

داء فقدان المناعة المكتسبة :


مدة الحضانة	قد تصل إلى 11 سنة، يكون خلالها المصاب حاملاً لحمّة السيداً (إيجابي المصل) بدون أعراض سريرية
جريدة المرض	حمة فقدان مناعة الإنسان (VIH)، يمكن إتلافها بسهولة بواسطة الحرارة (60°C) و كذلك بواسطة المطهرات العادية كالكحول و ماء جافيل
تطور المرض	بعد مرحلة كمون (مدة الحضانة) تهاجم حمة VIH الكريات المفاوية T4 و بذلك تتسبب في إضعاف الاستجابة المناعية المكتسبة فيصبح المريض عرضة لعدة أمراض انتهازية تؤدي به إلى الوفاة حتماً.
أعراض المرض	<ul style="list-style-type: none"> - العدوى الأولية : يمكن أن تصاحب بزكام و تعب شديد مع انتفاخ العقد المفاوية المجاورة لمكان دخول الحمة. - انتفاخ العقد المفاوية المزمن . - ظهور الأخماق الأولى على مستوى الجلد، و المخاطيات (سرطان Kaposi ، القلاع، الإسهال المزمن...) - ظهور عدة أمراض انتهازية. - تدهور عام لصحة المريض و هلاكه.
طرق العدوى	<ul style="list-style-type: none"> - عن طريق الاتصالات الجنسية بصفة خاصة حيث توجد حمة VIH في المنى و في الإفرازات المهبلية لدى المصابين بهذا الداء. - عن طريق الدم (تحقيق دم شخص إيجابي المصل لشخص سليم، استعمال أدوات حادة غير معقمة كالمحقفات و شفرات الحلاقة...).
الوقاية	<ul style="list-style-type: none"> - تجنب الاتصالات الجنسية غير المحمية و المشروعة - استعمال العازل الطبي - إخضاع دم المتبرعين لاختبار السيدا قبل استعماله - استعمال الأدوات الحادة المعقمة ذات الاستعمال الواحد
	<ul style="list-style-type: none"> - ليس هناك أي علاج ضد هذا الداء - كما أنه ليس هناك أي لقاح فعال، لذا وجب الاحتياط و الحذر، فالوقاية هي السلاح الوحيد ضد داء السيدا.



الوثيقة 17: مرض السيدا (مرض فقدان المناعة المكتسبة) Le syndrome de l'immunodéficience acquise (



الوثيقة 18: مرض السيدا (مرض فقدان المناعة المكتسبة)



الوثيقة 19: توزيع مرض السيدا عبر العالم حسب ONU

خلاصة :

يتبيّن إذن أنه من أجل الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً ينبغي تبني سلوكاً مسؤولاً و معقلنا يمكن تلخيصه في ثلاثة مواقف أساسية :

- ✓ تجنب الاتصالات الجنسية غير المحمية والمشروعة، وهذا يتطلب التخلّي عن الدعارة والزنّى.
- ✓ استعمال العازل الطبي لأنّه يحول دون تسرب الجراثيم المنقولة جنسياً أثناء الاتصالات الجنسية.
- ✓ العناية بنظافة الجسم وخاصة المناطق التناسلية التي ينبغي غسلها بالماء والصابون قبل وبعد كل اتصال جنسي.

و بالطبع فإن ظهور أي علامة توحّي بأحد أعراض أي من الأمراض المنقولة جنسياً تستوجب استشارة الطبيب فوراً.